

Engorde Fruit



Concentrado para la DIVISION CELULAR y CRECIMIENTO del fruto

COMPOSICIÓN

Pentóxido de Fósforo (P_2O_5) soluble en agua	30% p/p
Oxido de Potasio (K_2O) soluble en agua	33,0% p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua	0,2% p/p
Zinc (Zn) soluble en agua	0,2% p/p
Mono-di-tri-polisacaridos (Azúcares)	35% p/p
Boro (B) soluble en agua	0,2% p/p
Molibdeno (Mo) soluble en agua	0,01% p/p
Promotores de crecimiento Total	2% p/p
Ácido Fólico	1,0% p/p
AATC (Ácido Carboxílico)	1,5% p/p
Proteínas	8% p/p



Ph: 4-5

Aspecto: Polvo inodoro de color característico

Color: Amarillo

Low ph

CARACTERÍSTICAS

- Formulación tecnológica a base de Fósforo, Potasio, Manganeso, Zinc, Boro y Molibdeno de alta asimilación y sistemia por parte de los tejidos vegetales.
- Idóneo para ser aplicado en las etapas de máxima demanda de Potasio. Favorece el engorde y los calibres, la consistencias y la coloración de los frutos.
- Activa la síntesis y acumulación de azúcares y aceites. Especialmente recomendado en cultivos donde cambio de color, la concentración de azucares y el rendimiento graso son fundamentales.
- Evita bloqueos e interacciones con otros nutrientes.



BENEFICIOS

- Elaborado con sustancias naturales obtenidas a través de los más avanzados procesos biotecnológicos a partir de extractos de plantas
- Aporta componentes básicos para que la planta active todos sus procesos vitales
- Tiene efectos positivos sobre el amarre de frutos
- Suministra un complejo enzimático, hormonal y vitamínico que estimula la multiplicación celular
- Alta eficiencia en el desarrollo inicial de cualquier órgano de cosecha incluyendo aquellos que dependen mayormente de la diferenciación de células y tejidos
- Mayor homogeneidad hacia calibres grandes de empaque

¿QUE ES LA BIOESTIMULACIÓN?

La mejora del desempeño del cultivo a través de un incremento en la eficiencia de nutrición, mayor tolerancia al estrés o aumento de aspectos de calidad de la cosecha, mediante el uso de **sustancias específicas** en las que poco influye la cantidad de nutriente mineral.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Tomate, chile, pepino, calabacín, sandía, melón, pepino, calabaza.

Aplicación foliar. Dosis: 50-60 g/100 L de agua. Recomendaciones de uso: Debe ser aplicado a la aparición de las primeras flores, realizando varias aplicaciones a intervalos de 10-15 días.

Fresal, frambueso, zarzamora, arándano.

Aplicación foliar. Dosis: 50-60 g/100 L de agua. Recomendaciones de uso: Aplicar tras el amarre, con frutitos visibles y cada 15 días.

Patata.

Aplicación foliar. Dosis: 50-60 g/100 L de agua. Recomendaciones de uso: Aplicar justo antes del engrosamiento de órganos subterráneos, y repetir 2 veces con intervalo de 15 días hasta finalización de cosecha.

Ajo, cebolla.

Aplicación foliar. Dosis: 50-60 g/100 L de agua. Recomendaciones de uso: Aplicar al inicio de la formación del bulbo y repetir 15 días antes de cebolla vencida.

Coliflor, brócoli, lechuga, repollo.

Aplicación foliar. Dosis: 50-60 g/100 L de agua. Recomendaciones de uso: Aplicar al inicio de la botonadura o formación de cogollo, y repetir 15 días antes de la cosecha.

Frijol, guisantes, lentejas, cacahuete.

Aplicación foliar. Dosis: 50-60 g/100 L de agua. Recomendaciones de uso: Aplicar al inicio de vainas y cada carga de vainas.

Cítricos.

Dosis: 50 g/100 L de agua. Recomendaciones de uso: Realizar 2 aplicaciones, la primera aplicación a la caída de pétalos y la segunda aplicación a los 20-25 días de la anterior

Melocotón, guayabo, manzano, peral.

Dosis: 50 g/100 L de agua. Recomendaciones de uso: Realizar 2 aplicaciones, la primera tras el amarre y la segunda 20 días después.

Papaya.

Dosis: 50 g/100 L de agua. Recomendaciones de uso: Aplicar a partir de los primeros amarres y repetir cada 15 días hasta finalización de cosecha.

Aguacate.

Dosis: 300 g/ha. Recomendaciones de uso: Realizar 3-4 aplicaciones distanciadas 30 días, comenzado desde tamaño pimienta.

Mango.

Dosis: 50 g/100 L de agua. Recomendaciones de uso: Realizar 2 aplicaciones, la primera a 1/4 del tamaño final y repetir a los 25-30 días.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Engorde Fruit es un formulado hidrosoluble que destaca por su alto contenido en Fósforo, Potasio, Manganeso, Zinc, Boro y Molibdeno y de rápida asimilación por parte de las plantas, enriquecido por **ATC** y **Ácido Fólico**.


Engorde Fruit es idóneo para ser aplicado en etapas de máxima demanda de Fósforo, Potasio, Manganeso, Zinc, Boro y Molibdeno, en los cultivos más exigentes.

Engorde Fruit es un producto hidrosoluble, totalmente asimilable por las plantas y compatible con otros productos fertilizantes y fitosanitarios, por su pH ácido y tecnología de formulación.

Engorde Fruit es una fuente de Fósforo, Potasio, Manganeso, Zinc, Boro y Molibdeno natural y ecológico para los cultivos.

Como consecuencia, **Engorde Fruit** intensifica la absorción de agua y nutrientes, manteniendo la turgencia celular.

PRESENTACIÓN



20Kgs 10Kgs 5Kgs 1Kgs

